

Fluoxetina cloridrato

La fluoxetina è un inibitore altamente selettivo della ricaptazione della serotonina nel SNC, potenziando così l'attività farmacologica della serotonina. La fluoxetina apparentemente ha scarso effetto su altri neurotrasmettitori (ad esempio, dopamina o noradrenalina).

Indicazioni ed usi clinici:

La fluoxetina può essere utile per il trattamento dell'aggressività canina, dei comportamenti stereotipati (e di altri comportamenti ossessivo-compulsivi) e dell'ansia. Può essere utile nei gatti per i comportamenti sopra menzionati e, inoltre, per l'eliminazione inappropriata.

Dosaggi:

Cani:

- Per il trattamento aggiuntivo dei disturbi comportamentali (a discrezione del veterinario in base alla valutazione clinica):
- Per il trattamento dell'ansia da separazione canina in associazione a un piano di modifica del comportamento:

1-2 mg/kg PO una volta al giorno

1 mg/kg PO da una a due volte al giorno per 6-8 settimane per iniziare

0,5-1 mg/kg una volta al giorno

1-1,5 mg/kg al giorno (latenza all'effetto è di 1-4 settimane)

1-1,5 mg/kg PO una volta al giorno

1 mg/kg PO una volta al giorno (fino a 3 mg/kg PO una volta al giorno)

Gatti:

- Per aiutare a controllare la marcatura urinaria o l'ansia da separazione:

0,5-1 mg/kg per via orale una volta al giorno

- Per controllare il prurito quando altre terapie hanno fallito:

1-5 mg/gatto per via orale una volta al giorno; consigliare di ottenere gli esami di laboratorio basali. Valutare la terapia dopo 1-4 settimane. Ridurre gradualmente la dose nell'arco di 6-8 settimane.

0,5-1 mg/kg per via orale una volta al giorno

0,5-1 mg/kg, al giorno (latenza per l'effetto è di 1-4 settimane)

Formule allestibili:

- Transdermico 5 mg/ 0,1 ml
- Capsule appetibili
- Bustine
- Pasta appetibile
- Crocchette



VIA A. GIANGI, 2 - 47891 DOGANA (RSM)



PHMALABSRL.COM



0549 905826



333 3963296



ORDINI@PHMALABSRL.COM